

SANATOP PREVENT

Prevence proti opětovnému výskytu řas a plísní



SANATOP PREVENT je kapalná přísada do omítek, zdiva, malířských nátěrů a jiných minerálních stavebních materiálů proti vzniku plísní a řas, určená do exteriérů.

Rozsah použití: Ochrana zdiva, nátěrových hmot a jiných minerálních stavebních materiálů.

Návod k použití: Naředěný přípravek (viz tabulka) aplikujte nátěrem nebo postřikem na suchý očištěný povrch. V případě nutnosti likvidace plísní a jiných biologických nečistot doporučujeme nejdříve aplikovat přípravek Sanatop LIKVID, Sanatop LIKVID Profi, výrobce STACHEMA CZ.

Vydatnost: z 1 kg koncentráту se ošetří až 50 m² plochy.

Ředění:

Ředění aplikačních nátěrů		
při ochraně ve hmotě, např. injektáže, přídavek do malt, vnitřních a fasádních omítek, spárovacích hmot apod.	1:19	50 g do 1 kg hmoty
ochrana fasádních barev	1:9	100 g do 1 kg barvy

Přípravek i aplikační nátěr s přípravkem před použitím řádně promíchejte!

Skladování: v původních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotě od 5 °C do 25 °C. Chraňte před mrazem!

Záruční doba: 24 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Upozornění: Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Doba ochrany: minimálně 5 let

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Obsahuje: 4,5 g/kg pyrithion zinečnatý; 4,5 g/kg 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on; 8 g/kg terbutryn.

R-věty: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Nevylévejte do kanalizace. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachovat několik minut proudem vody.

Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

Datum revize: 12.11.2013